

Switch anti-calcineurines vers le belatacept (nulojix)

Camille Petit-Hoang mai 2021

Vérifier la sérologie EBV +++ -contre-indiqué si EBV négatif

1. Switch précoce (< 3 mois)

NULOJIX 10 mg/kg

J 1

J 5

J 14

J 28

Semaine 8

Semaine 12

Soit 6 injections au total

Puis 5 mg/kg tous les mois

Arrêt des CNI à J0

2. Switch tardif (> 3 mois)

NULOJIX 10 mg/kg

J1

J14

J28

Soit 3 injections au total

Puis 5 mg/kg tous les mois

Diminution des CNI de 50% à J15 et stop à J30

Pour tout patient mis sous Nulojix, il faut faire une demande auprès du laboratoire BMS pour accord :

- Par téléphone au 01.58.83.84.96
- Par courriel : infomed@bms.com :

Mail type "Nous souhaiterions instaurer un traitement par Nulojix à un patient M. NOM (3 1ères lettres).
Prénom (2 1ères lettres)

Greffé rénale

Poids : kg.

DDN :

Posologie :

- switch tardif donc 10mg/kg J1 J14 J28 puis 5mg/kg.
- Switch précoce 10 mg/kg J1 J5 J14 J28 Semaine 8 Semaine 12 Soit 6 injections au total puis 5 mg/kg tous les mois